



- 1) **Paciente admitido para cirurgia sem RT-PCR COVID-19:** adiar procedimento até obtenção do resultado (aguardar resultado em domicílio ou internado, no 3º andar AP ou 3º andar TT). Se procedimento inadiável coletar PCR COVID, manter precaução para COVID antes, durante e após o procedimento cirúrgico, até resultado do exame. Realizar o pós-operatório no 3º andar AP / 3º andar TT ou UTI 4 AP / UTI TT (leitos de isolamento), não é necessário aguardar o resultado para alta.
- 2) **Se procedimento de urgência / emergência:** considerar paciente suspeito - manter precaução para COVID antes, durante e após o procedimento cirúrgico. Realizar o pós-operatório no 3º andar AP / 3º andar TT ou UTI 4 AP / UTI TT (leitos de isolamento). Coletar PCR COVID no pós-operatório imediato, não é necessário aguardar o resultado para alta.
- 3) **Reoperação em paciente internado desde o primeiro procedimento:** Se até 15 dias da primeira coleta, considerar o resultado do RT-PCR já coletado. Caso tenha se passado mais de 15 dias, deve-se coletar novo RT-PCR.
- 4) **Reinternações de urgência:** seguir fluxo conforme item 2.
- 5) **Reinternações eletivas:** Se reoperação até 8 dias da primeira coleta RT-PCR, considerar o resultado já coletado. Caso tenha se passado mais de 8 dias, seguir fluxo institucional de investigação pré-operatória de COVID (questionário + coleta de PCR-COVID).